

Después de un Tratamiento de Endodoncia

El diente tratado no tendrá sensibilidad a lo helado o caliente, sin embargo este podría presentar bastante molestia al masticar. A dolorimiento al morder será más notable en los días 3, 4, y 5 después del procedimiento. Esto va a disminuir gradualmente durante los próximos 10-15 días. Le recomendamos que tome 600mg de Ibuprofeno (Advil, Motrin) o 300mg de acetaminofeno lo mismo que Tylenol regular cada 4 a 6 horas. Si usted no puede tomar ibuprofeno o Aspirina, Tylenol Extra Strength puede ser sustituido.

Siempre consulte con su médico si usted tiene alguna pregunta con respecto a nuestras recomendaciones y su medicación actual.

Probablemente un relleno temporal se ha colocado en el diente. Favor de contactar a su dentista general para una restauración permanente en cuanto sus síntomas disminuyan o dentro del plazo de un mes.
Si se le ha recetado algún medicamento, tómelo según las instrucciones.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en contacto con nosotros en cualquier momento.

10001 South IH-35, Suite 350
Austin, Texas 78748
Phone: 512-280-1216
Fax: 512-280-1217
Email: parksid@parksid-specialty.com
Web Site: Parksid-specialty.com